

## Precauciones

- Si es alérgico (hipersensible) al metotrexato.
- Si está en periodo de lactancia y, además, en indicaciones no oncológicas (tratamiento no relacionado con el cáncer).
- Si está embarazada.
- Si padece alcoholismo, hepatopatía alcohólica, u otra hepatopatía crónica.
- Si padece usted alguna enfermedad del sistema inmunitario, como SIDA.
- Tiene infecciones graves o reacciones de la piel.
- Si está administrando vacunas.
- Si existe una exposición continua al sol.
- Si tiene alguna enfermedad de la sangre.

## ¿Qué hacer si me olvido de tomar una dosis?

Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis siguiente, deje pasar la que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.



## ¡Programa EDUCARTE cae bien!



Programa de Educación  
al Paciente

Clínica General del Norte  
Carrera 48 No 70 - 28

[proedupacfam@clinicageneraldelnorte.com](mailto:proedupacfam@clinicageneraldelnorte.com)

PBX: 309 19 99 Ext. 11059

Celular: 3138056541

[www.clinicageneraldelnorte.com](http://www.clinicageneraldelnorte.com)

Barranquilla - Colombia



CLÍNICA  
GENERAL  
DEL NORTE

Un compromiso con la vida

## METOTREXATO



## ¿Qué es el Metotrexato?

Es un medicamento que se ha empleado para el tratamiento de enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide) y como quimioterapia para tratar diferentes tipos de cáncer.

El metotrexato interfiere en el crecimiento de ciertas células del cuerpo que se multiplican rápidamente y tienen efectos antiinflamatorios.



### Indicaciones:

- Leucemia linfoblástica aguda (enfermedad de la sangre o la médula ósea con un aumento del número de glóbulos blancos).
- Cáncer de mama.
- Cáncer de hueso (osteosarcoma).
- Cáncer de cabeza y cuello.
- Cáncer ginecológico (cori carcinoma, enfermedad trofoblástica - desarrollo de tumores asociados directamente con el embarazo).
- Cáncer del sistema linfático (linfomas no Hodgkin) en adultos y en niños.
- Cáncer de vejiga.

Además, se utiliza en el tratamiento de la artritis reumatoide; de la artritis crónica juvenil cuando la respuesta a antiinflamatorios no haya sido adecuada, psoriasis y artritis psoriásica (sólo cuando la gravedad lo requiera y hayan fracasado a otros tratamientos).


## Efectos Secundarios:

- Digestivo: estomatitis ulcerosa, úlceras bucales.



- Náuseas y distensión abdominal.

- Sanguíneas: mielo supresión (leucopenia)



- Neurológico: parestesia, cefalea.

- Malestar, cansancio no justificado



- Alérgicas: eritema, prurito, urticaria, foto dermatitis.

- Mayor susceptibilidad a sufrir infecciones.



## ¿Cómo se debe tomar?

- Para su uso por vía oral, se presenta en forma de comprimidos que contienen 2,5 mg. Cada uno y se ingieren enteras con agua, leche o comida.

- La dosis inicial puede variar entre 7,5 y 1 mg. (equivalente a 3-6 comprimidos) y se toma un solo día a la semana y siempre el mismo. Más adelante y en caso de deficiente respuesta, el médico puede recomendar dosis mayores, hasta 25 mg. a la semana.

- Puede tomarse la dosis semanal de una sola vez o bien repartirse en dos o tres tomas, pero siempre sin dejar trascorrir más de 24 h.

- Cuando se haya olvidado una dosis, debe continuarse la misma pauta de tratamiento y no tomarla fuera del periodo previsto ni tomar el doble en la dosis siguiente.

- Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico.

## ¿Cómo se elimina el metotrexato del cuerpo?

El metotrexato se elimina principalmente por vía renal.

La hidratación y la alcalinización urinaria previenen la precipitación del metotrexato y de su metabolito.